



بیمارستان موسی بن جعفر (ع)
MOUSABN E. JAFAR HOSPITAL

شماره سند: MH/ED//44
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
نوبت ویرایش: ۱

قرص پلاویکس



بیمارستان موسی بن جعفر (ع)

واحد آموزش به بیمار

منبع: medlineplus | clevelandclinic | webmd

پلاویکس

کلوپییدوگرل - ضد انعقاد خون



پیشگیری سکنه

کاهش خطر سکنه مغزی



حفاظت قلبی

پیشگیری از حمله قلبی



جلوگیری از لخته

کاهش چسبندگی پلاکت‌ها



خطر خونریزی

نظارت بر علائم خونریزی



مصرف بدون غذا

می‌توان با معده خالی مصرف کرد



مصرف روزانه

معمولاً یک قرص در روز

کلینیک پرستاری آموزش سلامت



همه روزه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ (داخلی ۱۲۶)

پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشد .

شماره تماس بیمارستان : ۰۵۱-۰۶۱-۳۸۵۹۶۰۶۱-۶

داخلی بخش قلب : ۳۲۰

آدرس سایت بیمارستان :

Msjhospital.ir

بهترین زمان مصرف پلاویکس زمان خاصی ندارد، اما توصیه می‌شود هر روز در یک زمان مشخص مصرف شود تا اثربخشی بهتری داشته باشد. این دارو را می‌توان با غذا یا بدون غذا مصرف کرد.

شایع ترین تداخل غذایی پلاویکس : آب گریپ فروت را نباید با داروی پلاویکس مصرف کرد

مصرف قهوه همزمان با پلاویکس منجر به بروز تداخل دارویی نمی‌شود. با این حال، هنگام مصرف پلاویکس، نباید زیاد قهوه بنوشید. قهوه می‌تواند مخاط معده را تحریک کند که گاهی اوقات باعث ناراحتی معده یا خونریزی می‌شود.

هیچ تداخل شناخته شده ای بین پلاویکس و الکل وجود ندارد. با این حال، مصرف الکل همراه با پلاویکس می‌تواند معده را تحریک کند. برای برخی از افراد، این وضعیت ممکن است خطر خونریزی، به ویژه در معده افراد را افزایش دهد.



از جمله داروهای رقیق کننده ی دیگری که پس از فنر زدن توسط پزشک تجویز میشوند عبارتند از :

زیلت - تیکا - بریلانتا - کلوپییدگرویل (اسویکس)

از کلوییدوگرویل یا پلاویکس برای پیشگیری از حمله ی قلبی و سکنه ی مغزی در مبتلایان به بیماری های قلبی (به خصوص افرادی که اخیرا دچار سکنه ی قلبی شده اند)، بیمارانی که اخیرا دچار سکنه مغزی شده اند و یا بیماران مبتلا به مشکلات گردش خون (مشکلات قلبی عروقی محیطی) استفاده می شود.

کلوییدوگل از اتصال پلاکت ها به همدیگر و تشکیل شدن لخته های خونی خطرناک جلوگیری می کند. پلاویکس یک نوع داروی ضد پلاکت است. این دارو باعث می شود تا خون به طور یکنواخت در بدن جریان نحوه ی استفاده از پلاویکس : قبل از شروع مصرف پلاویکس و در هر بار مصرف مجدد این دارو، راهنمای دارویی ارائه شده توسط داروساز و یا موجود در بسته بندی را به دقت بخوانید و اگر سوالی داشتید، حتما از پزشک خود و یا داروساز بپرسید.



پلاویکس یک نوع داروی بلعیدنی است که یک بار در روز و طبق دستور پزشک همراه با غذا و یا به صورت عادی مصرف می شود *** این دارو را به طور منظم و دقیق مصرف کنید تا بهترین تاثیر را بر سلامتی شما داشته باشد*** برای این که وعده ی مصرفی خود را فراموش نکنید، بهتر است این دارو را همیشه در یک ساعت معین از روز مصرف کنید*** دوز و طول مدت مصرف این دارو بستگی به شرایط پزشکی شما و نحوه ی واکنش بدن شما به درمان دارد *** اگر این دارو را برای جلوگیری از لخته شدن خون بعد از عمل جراحی استنت قلب یا جراحی های مشابه استفاده می کنید، این دارو را باید ماه ها و یا سال ها با آسپرین و طبق دستور پزشک مصرف کنید (بسته به روش جراحی و نوع استنت) *** برای جزئیات بیشتر و خطرات قطع مصرف زود هنگام دارو حتما با پزشک خود مشورت کنید *** حتی اگر در میانه ی درمان، احساس سلامتی و احساس خوبی پیدا کردید، باید دوره ی درمان را کامل کنید و داروهای تجویز شده را کامل مصرف کنید *** بدون مشورت پزشک به هیچ عنوان مصرف این دارو را خودسرانه قطع نکنید*** در هنگام مصرف این دارو از خوردن گریپ فروت یا نوشیدن آب گریپ فروت خودداری کنید، مگر اینکه پزشک یا داروساز بگوید که شما می توانید با خیال راحت از این میوه مصرف کنید .

عوارض جانبی پلاویکس : پلاویکس ممکن است عوارض جانبی خفیف یا جدی ایجاد کند. موارد ذکر شده در زیر حاوی برخی از عوارض جانبی کلیدی است که ممکن است هنگام مصرف پلاویکس رخ دهد .

این لیست شامل همه ی عوارض جانبی احتمالی نیست. عوارض جانبی شایع پلاویکس می تواند شامل موارد ذکر شده در زیر باشد:

خونریزی از بریدگی که بیش از حد معمول طول می کشد تا متوقف شود - خون دماغ - کبودی بیش از حد معمول و نامتعارف - تب - درد عضلانی - گیجی -
بثورات جلدی یا خارش پوست

اگر دچار خونریزی شده اید و به نظر می رسد که بیش از حد معمول طول کشیده و متوقف نشده است و یا اگر در ادرار و یا مدفوع خود خون مشاهده کردید، بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید. به غیر از خونریزی یا کبودی، اکثر این عوارض جانبی شایع ممکن است طی چند روز یا چند هفته از بین برود. اگر این موارد تشدید پیدا کردند و یا از بین نرفتند حتما با پزشک خود و یا یک دکتر داروساز مشورت کنید. در صورت بروز علائم عدم استفاده از این دارو، از جمله علائم حمله قلبی یا سکنه مغزی (مانند درد در قفسه ی سینه، درد در فک، درد در دست چپ، تنگی نفس، تعریق غیرمعمول، ضعف در یک طرف از بدن، لکنت زبان، تغییر دید ناگهانی، گیجی)، فوراً با اورژانس تماس بگیرید و درخواست کمک پزشکی کنید .